



EXERCICE 1 : Bac sport princ 2012

On se propose de déterminer le rôle attribué à un neurone postsynaptique M dans la transmission du message nerveux. Pour se faire, un dispositif expérimental représenté dans le document 1 a été utilisé.



Document 1

On porte des stimulations de même intensité I_1 et I_2 respectivement sur les terminaisons nerveuses A et B (voir document 1). Les enregistrements obtenus au niveau des oscilloscopes O_1 , O_2 , O_3 et O_4 sont résumés dans le document 2.




Document 2

- Dites si les stimulations I_1 et I_2 sont efficaces ou non.
- Identifiez, en justifiant votre réponse, les tracés a et b obtenus au niveau de l'oscilloscope O_3 .
- Déduisez la nature des synapses A-M et B-M.
- Expliquez pourquoi on a enregistré un potentiel de repos au niveau de l'oscilloscope O_4 quelque soit la stimulation (I_1 ou I_2) portée sur la terminaison nerveuse A ou B.
- En utilisant le même dispositif expérimental représenté par le document 1:
 - Proposez une première expérience permettant d'obtenir un potentiel d'action au niveau de l'oscilloscope O_4 en appliquant un nombre minimal de stimulations efficaces sur l'une des deux terminaisons nerveuses A ou B. Justifiez votre choix.
 - Proposez une deuxième expérience permettant d'obtenir le même résultat en activant les deux terminaisons nerveuses A et B par un nombre minimal de stimulations efficaces. Justifiez votre choix.
 - Schématisez, dans chaque proposition, les enregistrements attendus au niveau des oscilloscopes O_1 , O_2 , O_3 et O_4 .
- En exploitant les résultats des expériences précédentes et en faisant appel à vos connaissances, expliquez le rôle attribué au neurone postsynaptique M dans la transmission du message nerveux.

EXERCICE 2 : BAC SC P 17 (partiellement) ne convient pas aux bacs Mathématiques

On se propose d'étudier les aspects de la naissance et de la transmission du message nerveux. Pour cela, on utilise le circuit nerveux intervenant dans le réflexe myotatique représenté dans le document 2.



Document 2


Pour comprendre le fonctionnement du circuit nerveux impliqué dans le réflexe myotatique, on réalise les deux expériences suivantes :

Expérience 1 :

On exerce sur le fuseau neuromusculaire des étirements d'intensités croissantes E_1 , E_2 , E_3 et E_4 . Puis, on détermine :

- l'amplitude des potentiels de récepteur au niveau de l'oscilloscope O_1 et l'amplitude des potentiels d'action au niveau de l'oscilloscope O_2 .
- la fréquence des potentiels d'action au niveau de l'oscilloscope O_2 .

Les résultats obtenus sont présentés par les tracés a, b et c du document 3.



Document 3

1) Analysez les tracés a, b et c du document 3 en vue de dégager :

- une propriété du potentiel de récepteur.
- une propriété du potentiel d'action.
- une propriété du message nerveux.
- le rôle du fuseau neuromusculaire.

Expérience 2 :

On mesure la concentration en ions Na^+ et K^+ dans les corps cellulaires des motoneurones $\alpha 1$ et $\alpha 2$, avant et après injection de deux neurotransmetteurs X ou Y dans chacune des fentes synaptiques F1 et F2.

Le document 4 résume les résultats obtenus.

| | dans les corps cellulaires de $\alpha 1$ et $\alpha 2$ avant injection de X ou de Y | dans le corps cellulaire de $\alpha 1$ après injection dans F1 de : | | dans le corps cellulaire de $\alpha 2$ après injection dans F2 de : | |
|--|---|---|-----|---|-----|
| | | X | Y | X | Y |
| Concentration en ions Na^+ (UI) | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| Concentration en ions K^+ (UI) | 150 | 150 | 150 | 150 | 110 |


Document 4

- 2) A partir de l'analyse des résultats de l'expérience 2 et en faisant appel à vos connaissances :
- expliquez le mécanisme à l'origine de la modification de la concentration en ions Na^+ ou K^+ dans les corps cellulaires de $\alpha 1$ et $\alpha 2$, après l'injection du neurotransmetteur X ou du neurotransmetteur Y.
 - dégagez la conséquence de cette modification sur le potentiel de la membrane postsynaptique de chacun des corps cellulaires de $\alpha 1$ et $\alpha 2$.
 - précisez la nature de chacune des synapses S1 et S2.
- 3) Intégrez les informations tirées précédemment et vos connaissances en vue d'expliquer la coordination de l'activité des muscles extenseur et fléchisseur, suite à l'étirement du fuseau neuromusculaire du muscle extenseur d'intensité E3.

EXERCICE 3 Bac sport contr. 2012 ne convient pas aux bacs mathématiques

On se propose d'établir le circuit nerveux reliant un motoneurone M de la moelle épinière à l'un des deux muscles antagonistes de la cuisse : le quadriceps et le semi-tendineux. Le dispositif expérimental représenté par le document 1 montre l'emplacement des deux muscles. Des électrodes stimulatrices a et b sont placées au niveau des fuseaux neuromusculaires provenant des fuseaux neuromusculaires des deux muscles. Une électrode réceptrice, reliée à un oscilloscope, est placée au niveau du cône axonique du motoneurone M de la corne antérieure de la moelle épinière.


Document 1



On stimule

séparément en a puis en b. les enregistrements obtenus au niveau de l'oscilloscope relié au cône axonique du motoneurone M sont représentés dans le document 2.

Document 2



- Identifiez, en justifiant votre réponse, les deux tracés obtenus.
- Précisez, en justifiant votre réponse, lequel des deux muscles est relié au motoneurone M.
- Expliquez la différence du temps de latence entre les deux tracés.
- Représentez, par un schéma, les circuits nerveux reliant les fibres afférentes au motoneurone M.
- Expliquez comment se fait la coordination des deux muscles antagonistes suite à l'étirement du muscle semi-tendineux.

EXERCICE 4 : bac math. Pr.2012

On se propose d'étudier les phénomènes électriques enregistrés au niveau d'un neurone postsynaptique P, connecté à quatre neurones présynaptiques N₁, N₂, N₃ et N₄ (document 1)

Document 1


On réalise deux séries d'expériences en utilisant le montage du document 1

● Première série d'expériences :

1. Identifiez les potentiels postsynaptiques en O₁, O₂, O₃ et O₄ et indiquez leurs amplitudes.
2. Déduisez la nature des synapses N₁-P, N₂-P, N₃-P et N₄-P.

● Deuxième série d'expériences :

3. Indiquez la nature du potentiel obtenu en O₅ pour chacune des expériences 5, 6, 7 et 8. Justifiez votre réponse.
4. Précisez le nombre minimal d'excitations rapprochées qu'on doit appliquer en E₄ pour obtenir un potentiel d'action en O₅.
5. Exploitez les réponses aux questions 3 et 4 afin de déduire la propriété du neurone P.




| Expériences | Résultats | ddp en mv enregistrée au niveau de | | | | |
|--|-----------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | O ₁ | O ₂ | O ₃ | O ₄ | O ₅ |
| Expérience 1 : Une excitation efficace appliquée en E ₁ | | - 58 | | | | - 62 |
| Expérience 2 : Une excitation efficace appliquée en E ₂ | | | - 52 | | | - 55 |
| Expérience 3 : Une excitation efficace appliquée en E ₃ | | | | - 78 | | - 72 |

| Expériences | Nombre des excitations portées sur les neurones présynaptiques |
|--------------|--|
| Expérience 5 | Deux excitations efficaces rapprochées en E ₁ . |
| Expérience 6 | Deux excitations efficaces simultanées en E ₁ et E ₂ . |
| Expérience 7 | Trois excitations efficaces simultanées en E ₁ , E ₃ et E ₄ . |
| Expérience 8 | Deux excitations efficaces rapprochées en E ₃ . |

EXERCICE 5 : bac sc. P. 2012

On se propose d'étudier les mécanismes de la naissance et de la transmission du message nerveux. Pour cela on utilise le dispositif expérimental représenté par le document 1.



On réalise des expériences de stimulations sur les fibres nerveuses des neurones A, B et C du document 1 puis on enregistre leurs réponses à l'aide des oscilloscopes O₁, O₂ et O₃. Les expériences réalisées et les enregistrements obtenus sont représentés dans le tableau du document 2.

Document 2

1. A partir des informations de l'expérience 1 et du tracé A₁, dégagez une propriété de la fibre nerveuse.
2. Analysez les résultats des expériences 1 et 2 en vue de déduire :
 - a. une deuxième propriété de la fibre nerveuse.
 - b. la nature de la synapse S₁.
3. Analysez les tracés C₁, C₂ et C₃ en vue de déduire la nature de la synapse S₂.
4. Expliquez l'obtention du tracé D₂ en vue de :
 - déduire la fonction du neurone C.
 - la nature de la synapse S₃.
5. A partir de vos connaissances et des informations tirées des expériences précédentes, expliquez l'obtention du tracé D₃.

| Expériences | Enregistrements en O ₁ | Enregistrements en O ₂ | Enregistrements en O ₃ |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Expérience 1 : On porte une stimulation isolée en A d'intensité I ₁ | | | |
| Expérience 2 : On porte une stimulation isolée en A d'intensité I ₂ (I ₂ > I ₁) | | | |
| Expérience 3 : On porte deux stimulations très rapprochées en A d'intensité I ₂ | | | |
| Expérience 4 : On porte deux stimulations simultanées en A et en B d'intensité I ₂ | | | |



EXERCICE 6 : Bac math contr. 2012

On se propose d'étudier le fonctionnement du circuit nerveux du réflexe de flexion du pied chez la grenouille ; le document 1 représente le montage expérimental utilisé.

Document 1

On applique en S plusieurs stimulations très rapprochées ; les oscilloscopes O₁, O₂, O₃, O₄ et O₅ permettent de détecter les phénomènes électriques déclenchés ; le document 2 montre

les tracés obtenus.




Document 2

1. Faites correspondre chacun des tracés a, b, c, d et e aux oscilloscopes O₁, O₂, O₃, O₄ et O₅. Justifiez votre réponse.
2. En exploitant les données précédentes (document 1 & 2), expliquez la coordination de l'activité des deux muscles antagonistes M₁ et M₂ lors de ce réflexe de flexion.

EXERCICE 7 : Bac sc 09 cont


On cherche à préciser le circuit nerveux qui intervient dans le réflexe myotatique. On propose le dispositif expérimental, représenté par le document 1, avec lequel on réalise une série d'expériences.



Document 1

Expérience 1:

Grâce à une microélectrode R₀ reliée à un oscilloscope O₀, on enregistre l'activité électrique de la fibre F issue du fuseau neuromusculaire localisé dans le muscle M₁, en fonction de l'intensité de l'éirement de ce même muscle M₁. Les enregistrements obtenus sont représentés par le document 2.




Document 2

1. Faites une analyse comparative des enregistrements 1, 2 et en vue de déduire:

- les propriétés fondamentales du message nerveux.
- le rôle physiologique du fuseau neuromusculaire.

Expérience 2:

On porte une stimulation électrique efficace, sur la fibre F, au point S (voir document 1) et on enregistre la différence de potentiel (ddp) grâce à deux microélectrodes réceptrices R₁ et R₂ placées respectivement au niveau des cônes axoniques des motoneurons N₁ et N₂ et reliées aux oscilloscopes O₁ et O₂ (voir document 1).



Document 3

On mesure également les temps de latence séparant le moment de la stimulation et l'apparition de la réponse en R_1 et en R_2 . Les enregistrements obtenus sont représentés par le document 3.

2. a. Identifiez les phénomènes électriques enregistrés en R_1 et en R_2 en justifiant votre réponse.

b. Déduisez la nature des synapses mises en jeu au niveau des motoneurones N_1 et N_2 .

c. Sachant que le délai synaptique est de 0.5 milliseconde, que déduisez-vous de la comparaison des temps de latence L_1 et L_2 ?

3. A partir des informations dégagées précédemment, représentez sur le document 4 (à remettre avec la copie) :

a. les structures histologiques manquantes dans le circuit nerveux du réflexe myotatique.

b. l'activité nerveuse qu'on peut enregistrer par les électrodes réceptrices R_0, R_1, R_2, R_3 et R_4 suite à un fort étirement du muscle M_1 , dans chacun des oscilloscopes O_0, O_1, O_2, O_3 et O_4 .

EXERCICE 8


On s'intéresse aux mécanismes qui assurent la transmission du message nerveux entre les neurones. Le document ci-contre montre le montage expérimental sur lequel on réalise plusieurs expériences.

I. 1^{ère} série d'expériences:

On stimule en S_1 puis en S_2 , on obtient les résultats résumés dans le tableau suivant:

| | Ddp enregistré en O_1 | Ddp enregistré en O_2 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stimulation en S_1 | -80 mv | -70mv |
| Stimulation en S_2 | -60 mv | -70mv |

1. Les stimulations en S_1 et en S_2 sont elles efficaces? Justifiez.
2. Analysez ces résultats. Que peut-on déduire.
3. Expliquez les phénomènes électriques post synaptiques obtenus.



II. 2^{ème} série d'expériences:


A l'aide de micropipettes, on dépose des fortes doses de substances variées au niveau des fentes F_1 et F_2 . On enregistre la réponse obtenue en O_1 , puis immédiatement on pratique des stimulations efficaces en S_1 et en S_2 et on enregistre la nouvelle réponse. Les réponses obtenues sont comparables à celles obtenues dans la 1^{ère} série d'expériences. Les résultats sont récapitulés dans le tableau suivant: (oui: S'il y a réponse; non: s'il n'y a pas réponse).

| Substance déposée | Avant stimulation | | Après stimulation | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Fente synaptique | Réponse en O_1 | Stimulation | Réponse en O_1 |
| A | F_1 | Non | S_1 | Oui |
| | F_2 | Non | S_2 | Non |
| B | F_1 | Non | S_1 | Non |
| | F_2 | Non | S_2 | Oui |

1. Quelles conclusions pouvez-vous dégager à partir de l'exploitation des résultats avant et après stimulations.
2. Formulez deux hypothèses concernant l'action des substances A et B.
3. Comment peut-on vérifier expérimentalement ces hypothèses ?

III. 3^{ème} série d'expériences


On porte des stimulations simultanées ou successives en S_1 et en S_2 . Le protocole expérimental ainsi que les résultats sont présentés dans le tableau suivant:



Exploitez ces tracés et dégagez pour chaque expérience le rôle du neurone M.


EXERCICE 9

A fin de comprendre certains aspects de la communication nerveuse, on a réalisé plusieurs expériences grâce au montage expérimental représenté sur le document 1 suivant:



1- On porte sur chacun des boutons synaptiques B₁ et B₂ une stimulation efficace isolée. Les enregistrements obtenus en R₁ sont indiqués dans le tableau suivant:



Analysez les enregistrements obtenus en R₁ afin de déduire la nature des synapses S₁ et S₂.



2- Les états structuraux de la synapse S₃ avant et après une stimulation efficace du bouton synaptique B₃ sont indiqués sur le document 2 suivant:

Faites une analyse comparative de ces résultats en vue de dégager le mode de transmission du message nerveux au niveau de la synapse S₃.

3- On porte deux stimulations efficaces très rapprochées sur le bouton synaptique B₁. Les enregistrements obtenus en R₁, R₂ et R₃ sont indiqués dans le tableau suivant:




- Expliquez les enregistrements obtenus en R₁ et R₃.
- Précisez en justifiant votre réponse le type de neurone N₁ (excitateur ou inhibiteur)
- Comparez les enregistrements obtenus en R₁ et R₂, et déduisez une propriété du message nerveux.
- Que peut-on déduire de l'analyse des enregistrements obtenus en R₂ avant et après la micro-injection d'un liquide non conducteur (huile) au niveau d'un nœud de Ranvier de l'axone du neurone N₁?
- La naissance des enregistrements obtenus en R₁ et R₃ met en jeu deux types des canaux ioniques membranaires. Nommez ces canaux ioniques et les comparez.

EXERCICE 10 : Bac sport prin 2010

On se propose d'étudier les mécanismes de la naissance et de la transmission du message nerveux. Le document 1 représente le dispositif expérimental utilisé.


A, B et C = neurones présynaptiques
 M = neurone postsynaptique
 E₁, E₂ et E₃ = électrodes de stimulation
 O₁, O₂, O₃ et O₄ = oscilloscopes
 X₁ = membrane du neurone M
 X₂ = membrane du neurone C



On enregistre les phénomènes électriques au niveau des oscilloscopes O₁, O₂, O₃ et O₄ suite à l'excitation simultanée des neurones pré synaptiques par E₁, E₂ et E₃ :

- Le neurone A par une intensité i₁,
- Le neurone B par une intensité i₂,
- Le neurone C par une intensité i₃.

Le document 2 représente les résultats obtenus ;




- Nommez ces tracés
 - Analysez les enregistrements du document 2 en vue d'(e):
 - de déduire une condition nécessaire pour la naissance d'un message nerveux au niveau des neurones A, B et C.
 - d'expliquer la nature de la réponse enregistrée au niveau O₄.
 - de déduire la nature de la synapse B-M.


On porte, simultanément, une stimulation d'intensité i₁ sur le neurone A et une stimulation d'intensité i₂ sur chacun des neurones B et C. Les enregistrements obtenus de O₁, O₂, O₃ et O₄ sont présentés dans le document 3.

2. Exploitez les informations des documents 2, 3 et vos connaissances pour :

- Expliquer l'enregistrement obtenu au niveau de O₄.
- Préciser la nature de la synapse C-M.

On porte simultanément trois stimulations d'intensité i₂ sur les trois neurones AB et C. Les enregistrements obtenus au niveau des oscilloscopes O₁, O₂, O₃ et O₄ sont présentés dans le document 4.





3. Exploitez les informations fournies par le document 4 et vos connaissances pour :


- Préciser la nature de la synapse A-M.
- Déduire le rôle du neurone M dans la naissance du message nerveux au niveau de son cône axonique.

Afin de préciser le mécanisme mis en jeu dans le fonctionnement de la synapse C-M, on réalise les expériences suivantes:

Expérience 1 : à l'aide d'une micropipette, on injecte dans la fente synaptique de la synapse C-M, une substance chimique ; le GABA (l'acide gamma- aminobutyrique). L'enregistrement obtenu au niveau de O₄ est présenté dans le document 5.

Expérience 2 : à l'aide d'une micropipette, on injecte dans la fente synaptique de la synapse C-M, une substance chimique ; la toxine tétanique, puis on stimule le neurone C à l'aide d'une stimulation d'intensité efficace. L'enregistrement obtenu au niveau de O₄ est un potentiel de repos.

Expérience 3 : on injecte dans la fente synaptique de la synapse C-M du GABAB radioactif et on détecte la radioactivité dans cette zone. Les résultats obtenus sont indiqués dans le tableau suivant:




| Radioactivité au niveau de X ₁ (membrane de M) | Radioactivité au niveau de la fente synaptique de C-M | Radioactivité au niveau de X ₂ (membrane de C) |
|--|--|---|
| Forte | Faible | Nulle |

Exploitez les résultats de ces trois expériences en vue de dégager le mécanisme de fonctionnement de la synapse C-M.

EXERCICE 11 : Bac cont sc. 2010

Afin d'étudier les propriétés du tissu nerveux dans l'intégration et la transmission du message nerveux, on réalise une série d'expériences à l'aide du dispositif représenté par le document 1




E₁ et E₂ : électrodes stimulatrices
O₁, O₂, O₃, O_A et O_B : oscilloscopes
S_A et S_B : synapses

Document 1

Le tableau du document 2 représente une première série d'expériences réalisées sur les neurones A et B et les enregistrements obtenus au niveau des oscilloscopes O₁, O₂ et O₃.

Document 2



1. Analysez les enregistrements obtenus dans chacune des expériences 1, 2 et 3 afin :

- de déduire la nature de chacune des synapses SA et SB.
- de dégager les propriétés des potentiels enregistrés au niveau des oscilloscopes O₂ et O₃ (au niveau du neurone M).
- d'expliquer les propriétés intégratrices du neurone M.

Afin de montrer le mécanisme de la transmission synaptique au niveau des synapses S_A et S_B. On a réalisé une deuxième série d'expériences. Le document 3 résume les conditions expérimentales et les résultats obtenus.

Document 3


| Expériences | Expérience 1 : | Expérience 2 : | Expérience 3 : | Expérience 4 : |
|---|---|---|---|---|
| Substance injectée | Acétylcholine en S _A | Acétylcholine en S _B | GABA en S _A | GABA en S _B |
| Résultats : mesure de la variation de la concentration des ions Na ⁺ , K ⁺ et Cl ⁻ dans le corps cellulaire du neurone M | augmentation de la concentration des ions Na ⁺ | pas de variation de la concentration des ions Na ⁺ , K ⁺ et Cl ⁻ | pas de variation de la concentration des ions Na ⁺ , K ⁺ et Cl ⁻ | diminution de la concentration des ions K ⁺ et augmentation de la concentration des ions Cl ⁻ |

2. Exploitez les informations du document 3 et vos connaissances pour :

- Expliquer les résultats obtenus dans chacune des quatre expériences du document 3.
- Représenter les enregistrements qu'on peut obtenir au niveau des oscilloscopes O_A et O_B dans chacune des quatre expériences.

EXERCICE 12: Bac sprt prin 16ne convient pas aux bacs M

On se propose de déterminer les circuits nerveux impliqués dans le mécanisme de l'innervation réciproque de deux muscles antagonistes assurant la coordination de leur fonctionnement. Pour cela, on a réalisé deux expériences en utilisant le dispositif expérimental représenté dans le document 2.




Document 2

1. Expérience 1 :

On étire le muscle M1 et on enregistre les réponses au niveau des oscilloscopes O₁, O₂ et O₄.

Les résultats obtenus sont représentés dans le document 3.



Document 3


Exploitez les enregistrements du document 3 et vos connaissances en vue de :

- déduire le rôle du fuseau neuromusculaire.
- dégager la conséquence de l'étirement de M₁ sur l'activité de chacun des muscles M₁ et M₂.

2. **Expérience 2 :**

On porte, des stimulations St efficaces et rapprochées au niveau de la fibre sensitive Ia2 issue du fuseau neuromusculaire du muscle M2 et on enregistre au niveau des oscilloscopes O2 et O3. On mesure également les temps de latence séparant le moment de l'application des stimulations et l'apparition des réponses en O2 et en O3.

Les résultats obtenus sont représentés dans le document



Document 4


A partir de l'analyse des enregistrements du document 4 et en faisant appel à vos connaissances :

- précisez la nature des synapses mises en jeu au niveau des motoneurones α_1 et α_2 .
 - expliquez la différence des temps de latence mesurée, sachant que le délai synaptique est de 0.5ms.
 - représentez l'enregistrement qu'on peut obtenir au niveau des oscilloscopes O₄ et O₅.
 - déduisez la conséquence des stimulations St sur l'activité de chacun des muscles M₁ et M₂.
3. reproduisez, sur votre copie, les circuits nerveux du document 2 que vous complèterez par ce qui convient à partir des informations tirées des expériences 1 et 2 et de vos connaissances.

EXERCICE 13 : bac sprt con


17

On se propose d'étudier certains aspects du fonctionnement des synapses. Pour cela, on réalise quatre expériences en utilisant le dispositif expérimental représenté dans le document 2.



Document 2

On stimule, de manière efficace, séparément et simultanément les terminaisons axoniques A et B et la collatérale de C. Les réponses obtenues sont enregistrées au niveau des oscilloscopes O₁ et O₂ et sont présentées par le document 3.




Document 3

- Exploitez les données du document 3 en vue :
 - d'identifier les tracés 1 et 2.
 - d'expliquer l'obtention du tracé 1.
 - de préciser la nature des synapses A-C et B-C.
- Représentez, en justifiant votre réponse, les tracés attendus au niveau de O₁ :
 - suite à la stimulation efficace de la collatérale C.
 - suite à la stimulation efficace et simultanée en A, en B et au niveau de la collatérale de C.
- Déduisez la nature de la synapse C-collatérale de C.
- Expliquez les différences de réponses enregistrées au niveau de l'oscilloscope O₂ dans les deux expériences 3 et 4.
- A partir des informations dégagées précédemment et en faisant appel à vos connaissances, expliquez le rôle du neurone C.

EXERCICE 14: bac Math. Con. 13

On se propose d'étudier certains phénomènes électriques au niveau d'une chaîne neuronique. Le document 1 ci-dessous montre une chaîne de trois neurones N₁, N₂ et N₃:




- N₁, N₂ et N₃ sont les neurones constituant la chaîne neuronique
- St₁ et St₂ sont les lieux de stimulations électriques
- O₁, O₂, O₃, O₄ et O₅ sont des oscilloscopes (lieux de l'enregistrement de la variation du potentiel membranaire au niveau des neurones N₁, N₂ et N₃)

En utilisant le dispositif expérimental du document 1 ci-dessus, on réalise les deux expériences suivantes:

Expérience 1

On port en St₁ une stimulation efficace ; les réponses obtenues en O₃ et O₅ sont représentées sur le document 2.



Document 2

- En exploitant les données des deux documents 1 et 2 :
 - schématisez les tracés enregistrés en O₁, en O₂ et en O₄.
 - expliquez l'obtention des tracés enregistrés en O₃ et en O₅ (document 2).

c. déduisez la nature de chacun des deux neurones N_1 et N_2 .

Expérience 2:

On applique une stimulation isolée en st_2 ; on obtient en O_2 et en O_3 les tracés indiqués sur le document 3.

- En tenant compte de ces tracés, indiquez la nature de la réponse que l'on peut obtenir en O_3 si on porte en st_2 trois stimulations rapprochées et de même intensité que celle appliquée dans l'expérience 2 ; justifiez votre réponse.
- A partir des expériences 1 et 2, expliquez alors le rôle du neurone N_2 dans la transmission du message nerveux.

EXERCICE 15 : BAC SC PRIN 14 ne convient pas aux bacs M

Dans le but d'étudier quelques aspects du réflexe myotatique, on utilise le dispositif expérimental du document 7 pour réaliser les deux expériences 1 et 2.

Expérience 1: on exerce sur le fuseau neuromusculaire des étirements d'intensités croissantes E_1 , E_2 et E_3 puis on enregistre l'activité électrique au niveau de O_1 , O_2 et O_3 . Les enregistrements obtenus sont représentés par le document 8.





1. Exploitez les résultats du document 8 afin de dégager :

- Deux propriétés du potentiel de récepteur,
- deux propriétés du potentiel d'action et une propriété du message nerveux.
- Le rôle du fuseau neuromusculaire.

Expérience 2:


On applique sur le fuseau neuromusculaire un étirement d'intensité E_3 . On obtient sur les oscilloscopes O_4 et O_5 les enregistrements représentés par le document 9.

- a. analysez le tracé a afin de déduire la nature de la synapse S_1 .
- expliquez l'obtention du tracé b.
- dégagez la nature des synapses S_2 et S_3 .
- a. représentez l'enregistrement obtenu sur chacun des oscilloscopes O_6 et O_7 suite à l'étirement du fuseau neuromusculaire d'intensité E_3 .
- b. précisez l'effet de l'étirement d'intensité E_3 sur l'activité de chacun des muscles extenseur et fléchisseur.



EXERCICE 16 : bac sprt prn14

On se propose d'étudier certains aspects du fonctionnement du neurone. Pour ce faire, on a réalisé deux séries d'expériences en utilisant le montage expérimental représenté dans le document 2.



Document 2

Première série d'expériences :

- **Expérience 1:** une excitation efficace E_1 est portée au niveau de la terminaison axonique T_1 . Le tracé 1 du tableau 1 représente l'enregistrement obtenu au niveau de l'oscilloscope O_2 .
- **Expérience 2:** deux excitations efficaces et simultanées E_1 et E_2 sont portées respectivement au niveau des terminaisons axoniques T_1 et T_2 . Le tracé 2 du tableau 1 représente l'enregistrement obtenu au niveau de l'oscilloscope O_2 .

1. Analysez les tracés 1 et 2 du tableau 1 en vue de déduire la nature des synapses T_1-N_2 et T_2-N_2 .

Deuxième série d'expériences :

- **Expérience 3:** une excitation efficace E_3 est portée au niveau de la terminaison axonique T_3 . Le tracé 3 du tableau 2 représente l'enregistrement obtenu au niveau

de l'oscilloscope O_1 .

- **Expérience 4:** deux excitations efficaces et simultanées E_3 et E_4 sont portées respectivement au niveau des terminaisons axoniques T_3 et T_4 . Le tracé 4 du tableau 2 représente l'enregistrement obtenu au niveau de l'oscilloscope O_2 .

2. Analysez les tracés 3 et 4 du tableau 2 afin d'identifier la nature des synapses T_3-N_1 , T_4-N_1 et N_1-N_2 mises en jeu par cette deuxième série d'expériences.

3. Représentez le tracé qu'on pourrait enregistrer au niveau de l'oscilloscope O_2 lorsqu'on porte des stimulations efficaces et simultanées sur les terminaisons axoniques T_1 , T_2 , T_3 et T_4 . Justifiez votre réponse.

4. Expliquez, à partir des informations précédentes et de vos connaissances, les principaux événements qui se produisent entre les deux électrodes R_1 et R_2 , à la suite des excitations efficaces et simultanées des terminaisons axoniques T_3 et T_4 .




Tableau 1





Tableau 2

EXERCICE 17 : BAC MATH 16


On se propose d'étudier certains aspects de la naissance et de la propagation du message nerveux.

1) Le document 1 représente schématiquement deux types de fibres nerveuses A et B. Identifiez ces deux types de fibres.



Document 1


2) On porte sur l'une des deux fibres nerveuses A ou B des stimulations électriques d'intensités croissantes et on mesure l'amplitude du potentiel membranaire obtenu suite à chaque stimulation. Le document 2 suivant représente les résultats obtenus.



Document 2


Analysez ces résultats en vue :

- a- de préciser les intensités infraliminaires et supraliminaires.
 - b- d'identifier les potentiels enregistrés avec les intensités I_3 et I_6 .
 - c- de dégager une propriété de chacun des deux potentiels identifiés en b.
- 3) On porte sur chacune des deux fibres A et B une stimulation électrique d'intensité I_6 et on enregistre le potentiel membranaire en utilisant deux électrodes réceptrices R_1 et R_2 séparées par une distance égale à 2 cm et reliées aux oscilloscopes O_1 et O_2 . Le dispositif expérimental utilisé figure sur le document 3.



Document 3

Les enregistrements ainsi obtenus sont indiqués sur le document 4.




Document 4

- a- Calculez la vitesse V_A du message nerveux se propageant au niveau de la fibre A et la vitesse V_B du message se propageant au niveau de la fibre B.
- b- Expliquez la différence entre V_A et V_B .

EXERCICE 18 (BAC SC PRIN 15)


On se propose d'étudier le mécanisme de la transmission du message nerveux à travers les synapses. Pour cela on réalise deux expériences en utilisant le dispositif expérimental représenté dans le document 2.



Document 2

Expérience 1 :

On porte une stimulation efficace St_1 au niveau de l'axone du neurone N_1 . Le tracé du document 3 représente l'enregistrement obtenu au niveau de l'oscilloscope O.



Document 3


Expérience 2 :

On porte, simultanément, une stimulation efficace St_1 au niveau de la terminaison axonique du neurone N_1 et deux stimulations efficaces, successives et très rapprochées St_2 au niveau de la terminaison axonique du neurone N_2 . Il en résulte une contraction du muscle M.

- 1) Exploitez les résultats des expériences 1 et 2 en vue de :
 - a- préciser la nature des synapses N_1-N_3 , et N_2-N_4 .
 - b- dégager deux propriétés du message nerveux.
- 2) En tenant compte des informations dégagées précédemment et de vos connaissances, expliquez la fonction assurée par le neurone N_4 .

EXERCICE 19 : bac MP15

On se propose d'étudier le mode de fonctionnement des synapses. Pour cela, on réalise deux expériences selon le dispositif expérimental représenté dans le document 2.



Document 2

Expérience 1 : On porte deux stimulations d'intensités croissantes I_1 et I_2 en E et on enregistre, parallèlement, les différences de potentiels au niveau des oscilloscopes O_1 , O_2 , O_3 et O_4 . Les résultats sont représentés dans le tableau suivant :

| | | ddp (en mV) enregistrée au niveau de : | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | O ₁ | O ₂ | O ₃ | O ₄ |
| Intensité du stimulus | I ₁ | -60 | -70 | -70 | -70 |
| | I ₂ > I ₁ | +30 | -58 | +30 | +30 |


1) Exploitez les données fournies dans le tableau en vue :

- d'identifier la nature des potentiels obtenus en O₁, O₂, O₃ et O₄, suite aux stimulations d'intensités I₁ et I₂.
- d'expliquer la différence de réponses enregistrées en O₂ et en O₃ suite à la stimulation I₂.

Expérience 2 : On porte en E deux stimulations très rapprochées d'intensité I₂. Le document 3 représente l'enregistrement obtenu en O₃.

2) Exploitez les résultats des expériences 1 et 2 en vue :

- d'expliquer l'enregistrement obtenu en O₃ (document 3).
- de déduire la nature de la synapse N₂-N₃.




Document 3

EXERCICE 20: bac sprt P15

Neurophysiologie (le point)

On se propose d'étudier certaines fonctions assurées par trois neurones N₁, N₂ et N₃ impliqués dans le circuit neuronique représenté par le document 2.



Deux expériences ont été réalisées.


Expérience 1 : On porte sur le corpuscule de Pacini, une stimulation mécanique S₁ d'intensité I₁. On mesure, parallèlement, l'amplitude du potentiel membranaire de la fibre nerveuse au niveau des oscilloscopes O₁, O₂ et O₃. Le tableau suivant traduit les résultats obtenus.

| Oscilloscopes | O ₁ | O ₂ | O ₃ |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Amplitude du potentiel membranaire de la fibre (mV) | 13 | 8 | 0 |

1- Analysez les résultats du tableau en vue :

- d'identifier la nature de la réponse obtenue dans chacun des oscilloscopes O₁, O₂ et O₃.
- de dégager une propriété fonctionnelle du corpuscule de Pacini.
- de dégager une propriété du message nerveux.

Expérience 2 : On applique sur le corpuscule de Pacini deux stimulations isolées S₂ et S₃ d'intensités croissantes I₂ et I₃ supérieures à I₁. Les enregistrements obtenus en O₂ et O₃ sont représentés par le document 3.




Document 3

2- Analysez les tracés obtenus en O₂ et en O₃ en vue de dégager une deuxième propriété du message nerveux.

La même stimulation S₂ portée sur le corpuscule de Pacini, a permis d'enregistrer au niveau de O₄ le tracé représenté par le document 4.


- 3- Expliquez le résultat obtenu en O₄.
- 4- Représentez le tracé qu'on devrait enregistrer au niveau de O₅, suite à la stimulation S₃ portée sur le corpuscule de Pacini.



Document 4

- 5- Dégagez, à partir des données précédentes et de vos connaissances, les fonctions assurées par chacun des neurones N₁, N₂ et N₃ dans la communication nerveuse.

Document 4 (à remettre avec la copie)



EXERCICE 1 : BAC SPRT PRIN 12

1- I_1 et I_2 , stimulations efficaces car il y a enregistrements de potentiels post synaptiques.

2- Identification des tracés

• Le tracé a est une légère dépolarisation d'amplitude 10 mv qui rapproche le neurone postsynaptique de la valeur seuil (-50mv) : c'est un PPSE

• L'enregistrement b est une hyperpolarisation d'amplitude 8 mv faisant éloigner le neurone postsynaptique de la valeur seuil : c'est un PPSI

3- Nature des synapses :

■ La synapse A-M: synapse excitatrice.

■ La synapse B-M: synapse inhibitrice.

4- Quelque soit la stimulation efficace I_1 ou I_2 portée sur la terminaison nerveuse A ou B, on enregistre au niveau du cône axonique (O_3) un PPS qui n'arrive pas à O_4 .

5-

a- *une seule stimulation I_1 => PPSE d'amplitude 10 mv, incapable d'engendrer un PA au niveau du cône axonique. D'où l'absence de PA au niveau de O_4 .

* deux stimulations I_1 efficaces, successives et rapprochées au niveau de A par sommation temporelle => Le PPSE global d'amplitude 20 mv atteint le seuil et déclenche la naissance d'un PA au niveau du cône axonique du neurone M. Ce PA se propage jusqu' à O_4 .

b- On stimule simultanément les neurones A et B de la manière suivante :


- 3 stimulations efficaces et rapprochées de A

- une seule stimulation efficace de B

Résultat : le PPS global serait d'amplitude $+30 - 8 = 22$ mv => dépolarisation obtenue par sommation spatio-temporelle de deux PPSE et d'un PPSI permettant l'atteinte de la valeur seuil $-70+22$

= -48 mV => naissance d'un PA au niveau de O_3 qui se propage jusqu'à O_4 .

c- Enregistrements :



6- Le neurone postsynaptique M a la capacité d'intégrer les informations qui lui parviennent des neurones présynaptiques par sommation temporelle et spatiale des PPS. Si la somme algébrique des PPS obtenue atteint le seuil au niveau du cône axonique, il y a naissance et propagation d'un message nerveux. Dans le cas contraire, aucun message ne prend naissance.

EXERCICE 2 : BAC SC PRIN 17

EXERCICE 3 BAC SPRT CONT 12

1.

- La stimulation en « a » donne une légère dépolarisation qui rapproche le potentiel du motoneurone M de la valeur seuil : c'est un PPSE

- La stimulation en « b » donne une hyperpolarisation qui éloigne le potentiel du motoneurone M du seuil : c'est un PPSI.

2- La stimulation de la fibre afférente reliée au semi-tendineux a donné naissance, au niveau du cône axonique du motoneurone M, à un PPSE, donc le motoneurone M est relié au semi-tendineux

3-

- Après stimulation en a, le message nerveux afférent atteint le motoneurone M après un retard de 0.6 ms. Sachant que le délai synaptique est de 0.5 ms => ce message a donc franchi une seule synapse.
- Après stimulation en b, le message nerveux afférent atteint le motoneurone M après un retard de 1.2 ms > (0.5ms x 2). => ce message a donc franchi au moins deux synapses

4-




Schéma représentant les circuits nerveux reliant les fibres afférentes au motoneurone M

5- L'étirement du semi-tendineux est converti par le fuseau neuromusculaire de ce muscle en message nerveux sensitif. Ce message est conduit par la fibre nerveuse afférente Ia vers la moelle épinière où il active directement le motoneurone M. un message nerveux efferent est alors conduit par ce motoneurone vers le semi-tendineux et entraîne sa contraction. En même temps, par l'intermédiaire d'un interneurone inhibiteur, le motoneurone qui innerve? Les fibres musculaires du quadriceps est inhibé d'où le relâchement du quadriceps.

EXERCICE 4 : BAC MATH PRIN 12

1 & 2 & 3

| Expérience | Nature du potentiel obtenu en O_5 | Justification (exiger le type de sommation et l'amplitude du potentiel global) |
|------------|-------------------------------------|--|
| 5 | PPSE | Etant donné qu'une excitation isolée portée en E_1 engendre au niveau du cône axonique (O_5) un PPSE d'amplitude 8 mv (expérience 1); les deux excitations successives rapprochées engendrent donc un PPSE global d'amplitude 16 mv résultant d'une sommation temporelle de deux PPSE successifs (8+ 8 mv) |
| 6 | PA | Le PPSE global déclenché au niveau du cône axonique est d'amplitude égale à 23 mv ; il résulte d'une sommation spatiale d'un PPSE d'amplitude 8 mv (identique à celui de l'expérience 1) et d'un PPSE d'amplitude 15 mv (identique à celui de l'expérience 2). Ce PPSE global dépasse le seuil d'où le PA obtenu en O_5 |
| 7 | PPSE | - l'excitation isolée en E_1 rapproche de 8 mv (expérience 1) - l'excitation isolée en E_3 éloigne de 2 mv (expérience 3) - l'excitation isolée en E_4 rapproche de 6 mv (expérience 4) Les excitations simultanées en E_1 , E_3 et E_4 engendrent un PPSE global d'amplitude 12 mv résultant d'une sommation spatiale des deux PPSE (8+ 6) mv et du PPSI (2mv),c'est-à-dire (12 = 8 + 6 - 2) mv |
| 8 | PPSI | - l'excitation isolée en E_3 éloigne de 2 mv (expérience 3) Les deux excitations successives portées en E_3 engendrent un PPSI global d'amplitude 4 mv résultant d'une sommation temporelle des deux PPSI (2 + 2) mv |

| Oscilloscope | O_1 | O_2 | O_3 | O_4 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Identification du PPS | PPSE | PPSE | PPSI | PPSE |
| Amplitude | 12 mv | 18 mv | 8 mv | 10 mv |

| Synapse | N_1 -P | N_2 -P | N_3 -P | N_4 -P |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nature | Synapse excitatrice | Synapse excitatrice | Synapse inhibitrice | Synapse excitatrice |

4. Une excitation isolée portée en E_4 est à l'origine d'un PPSE d'amplitude 6 mv en O_5 (cône axonique)
 Pour obtenir un PA à ce niveau, il faut un PPSE global d'amplitude ≥ 20 mv; pour cela il faut porter au minimum 4 excitations rapprochées en E_4 ($4 \times 6mv = 24$ mv).
- 5- Le neurone P est capable d'intégrer toutes les informations nerveuses qui lui parviennent; c'est un neurone intégrateur.

EXERCICE 5 : BAC SC P 12

1°/

La stimulation du neurone A entraîne une dépolarisation de 15 mv.

Propriété : La fibre nerveuse est **excitable** (répond à une stimulation).

2°/

Analyse :

Exp.1 : La stimulation d'intensité I_1 portée sur le neurone A permet l'enregistrement :

- d'une dépolarisation n'atteignant pas le seuil de -50 mv en O_1 .
- d'un PR en O_2 et un PR en O_3 .

Exp.2 : La stimulation d'intensité $I_2 > I_1$ portée en A permet d'enregistrer :

- une dépolarisation en O_1 qui atteint le seuil de -50 mv et déclenche un PA.
- une dépolarisation postsynaptique en O_2 (un PPSE).
- un PR en O_3 .

Déductions :

a. Propriété de la fibre nerveuse : Elle a un seuil de potentiel nécessaire pour le déclenchement de PA.

b. La synapse S_1 est excitatrice puisqu'on enregistré un PPSE en O_2 .

3°/ Analyse des résultats de l'expérience 3 :

- Les 2 stimulations d'intensité I_2 très rapprochées en A, sont à l'origine de 2 PA enregistrés en O_1
- En O_2 , on enregistre un PPSE global qui atteint le seuil et qui résulte de la sommation temporelle des 2 PPSE successifs ; ce PPSE est à l'origine du PA.
- Le tracé C_3 obtenu en O_3 représente un PPSE d'amplitude environ 13 mv.

Déduction : La synapse S_2 est excitatrice.

4°/ Explication des résultats de l'expérience 4 :

Le tracé D_2 enregistré en O_2 suite à 2 stimulations simultanées de A et B d'intensité I_2 est un PPSE global d'amplitude 5 mv; cette diminution d'amplitude s'explique par la sommation spatiale d'un PPSE et d'un PPSI.

Déductions :

- Le neurone C est un neurone intégrateur.
- La synapse S_3 est inhibitrice.

5°/ Dans les conditions expérimentales (expérience 4), le message nerveux se propage dans les deux sens d'où l'obtention du tracé D_3

EXERCICE 6 : BAC M CON 12

1-

| Oscilloscope. | tracé obtenu | Justification |
|---------------|--------------|---|
| O_1 | d | Plusieurs excitations efficaces rapprochées en S déclenchent un train de PA propageables qui seraient enregistrés en O_1 |
| O_2 | b | Les PA atteignant l'interneurone inhibiteur I_2 sont à l'origine de PPSI successifs qui s'additionnent et engendrent au niveau du cône axonique du motoneurone du muscle extenseur (M_2) un PPSI global qui éloigne le potentiel membranaire du seuil |
| O_3 | e | Les PA atteignant l'interneurone excitateur I_1 sont à l'origine de PPSE successifs qui s'additionnent et engendrent au niveau du cône axonique du motoneurone du muscle fléchisseur (M_1) un PPSE global qui atteint le seuil suivi d'un PA |
| O_4 | c | Le PA prenant naissance au niveau du cône axonique du motoneurone innervant le muscle M_1 se propage; il est alors enregistré au niveau de l'axone moteur |
| O_5 | a | Le PPSI global déclenché au niveau du cône axonique du motoneurone innervant le muscle M_2 ne déclenche pas un PA d'où le PR enregistré au niveau de l'axone moteur |

2-

Le message nerveux sensitif (déclenché en S) a une double action:

- il active le motoneurone du muscle fléchisseur M_1 (tracé c) par l'intermédiaire de l'interneurone excitateur I_1 et entraîne alors sa contraction
- il inhibe le motoneurone du muscle M_2 (tracé a) par l'intermédiaire de l'interneurone inhibiteur I_2 (tracé b) et entraîne alors le relâchement de ce muscle.

La contraction du muscle fléchisseur M_1 est accompagnée du relâchement du muscle antagoniste (le muscle extenseur M_2); cette coordination de l'activité de ces deux muscles antagonistes s'explique par l'innervation réciproque.

EXERCICE 7 : bac sc cont 2009

1.

| Enregistrement 1 | Enregistrement 2 | Enregistrement 3 |
|------------------------------------|--|---|
| Pas de message nerveux (pas de PA) | message nerveux avec des PA de même amplitude et de fréquence faible | message nerveux avec des PA de même amplitude et de fréquence plus élevée que celle de l'enregistrement 2 |
| 0,25 pt | 0,5 pt | 0,5 pt |

Déductions:

Propriétés fondamentales du message nerveux:

- loi du tout ou rien
- codage du message nerveux en modulation de fréquence
- Rôle du fuseau neuromusculaire (FNM):
 - le FNM convertit l'énergie du stimulus mécanique en message nerveux (énergie électrique) : (ou il réalise la transduction sensorielle)

2-

a)

- Enregistrement en R_1 : PPSE \rightarrow dépolarisation d'amplitude 10 mv
- Enregistrement en R_2 : PPSI \rightarrow hyperpolarisation d'amplitude 5 mv

b)

- au niveau de N_1 : synapse excitatrice
- au niveau de N_2 : synapse inhibitrice

c)

$L_1 = 0,8 \text{ ms} (= 0,3 + 0,5 \text{ ms}) \rightarrow$ un seul délai synaptique

$L_2 = 1,3 \text{ ms} (= 0,3 + 2 \times 0,5 \text{ ms}) \rightarrow$ deux délais synaptiques

Déductions:

- entre S et N_1 , il y a une seule synapse
- entre S et N_2 , il y a deux synapses

EXERCICE 9

1.

| Conditions expérimentales | Analyse | Déduction |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| Stimulation du bouton B_1 | Enregistrement d'un PPSE qui atteint -60 mv | La synapse S_1 est excitatrice |
| Stimulation du bouton B_2 | Enregistrement d'un PPSI qui atteint -78 mv | La synapse S_2 est inhibitrice |

2- (analyse : 0,25 x 4 + déduction : 0,2 5)

| Etats structuraux de la synapse | | Avant la stimulation de B_3 | Après la stimulation de B_3 |
|---------------------------------|--|--|---|
| Analyse comparative | Nombre des vésicules dans le bouton synaptique | bouton synaptique riche en vésicules synaptiques | bouton synaptique pauvre en vésicules synaptiques |
| | Etat des vésicules dans le bouton synaptique | Toutes vésicules synaptiques sont fermées | Certaines vésicules synaptiques sont en exocytose |
| Déduction | l'existence des vésicules synaptiques <u>en exocytose</u> suite à l'arrivée d'un potentiel d'action présynaptique prouve qu'il y a libération d'une substance chimique (neurotransmetteur) dans la fente synaptique, qui assure la transmission du message nerveux | | |

3-

a- (0,75point + 0,75 point)

| Explication de l'enregistrement obtenu en R_1 | Explication de l'enregistrement obtenu en R_3 |
|--|--|
| Le PPSR a une amplitude égale à la somme de deux PPSE successifs provenant de la même synapse excitatrice S_1 (10 mv + 10 mv) donc c'est PPSE qui atteint le seuil (-50 mv) et engendre un potentiel d'action postsynaptique : il s'agit d'une sommation temporelle | Le PPSR a une amplitude égale à la somme algébrique de trois PPSE unitaires provenant de trois synapses excitatrices issues d'un même neurone présynaptique N_1 donc c'est PPSE qui atteint le seuil (-50 mv) et engendre un potentiel d'action postsynaptique : il s'agit d'une sommation spatiale |

b- (0,25 x 2)

| Identification du type du neurone N_1 | Justification |
|---|--|
| Le neurone N_1 est excitateur | Le PPSR enregistré au niveau du cône axonique du neurone N_2 suite à l'activation du neurone N_1 est un PPSE |

c-(0,25 x 3)

| Comparaison des enregistrements obtenus en R_1 et R_2 | Déduction |
|--|--|
| - l'enregistrement obtenu en R_1 (cône axonique de N_1) est un potentiel d'action d'amplitude 100 mv - l'enregistrement obtenu en R_2 (axone de N_1) est un potentiel d'action d'amplitude 100 mv | Le message nerveux (PA) se propage le long du neurone en gardant la même amplitude donc il <u>obéit à la loi du tout ou rien</u> |

d-(0,25 x 3)

| Analyse | Déduction |
|--|--|
| - avant la micro -injection d'un liquide non conducteur au niveau d'un nœud de Ranvier de l'axone du neurone N_1 on enregistre au niveau de R_2 un potentiel d'action - après la micro -injection d'un liquide non conducteur au niveau d'un nœud de Ranvier de l'axone du neurone N_1 on enregistre au niveau de R_2 un potentiel de repos (absence d'un PA) | Le message nerveux (PA) se propage le long d'une fibre myélinisée (axone de N_1) en sautant d'un nœud de Ranvier au nœud voisin : c'est propagation saltatoire |

e- (1,25 point)

| Canaux ioniques | CVD | CCD |
|-----------------|-----|----------|
| | | Protéine |

| | | |
|---|---|--|
| Localisation | <ul style="list-style-type: none"> ▪ cône axonique ▪ nœuds de Ranvier ▪ boutons synaptiques | Membrane postsynaptique |
| condition de fonctionnement (ouverture) | Variation du potentiel de membrane : <ul style="list-style-type: none"> ▪ CVD Na⁺: -50mv ▪ CVD K⁺: +30mv ▪ CVD Ca²⁺ : arrivée d'un PA | Fixation d'un neurotransmetteur sur les récepteurs spécifiques |
| Rôle physiologique | <ul style="list-style-type: none"> * Naissance et propagation du message nerveux. * Entrée des ions Ca²⁺ | Transmission synaptique du message nerveux |

Exercice 10 Bac sport prin 2010

1) a-

- En O₁ : potentiel de repos (PR)
- En O₂ : potentiel d'action(PA)
- En O₃ : potentiel de repos (PR)
- En O₄ : potentiel post synaptique excitateur (PPSE)

b- **Enregistrements au niveau de O₁ et de O₃ :**

Suite à des stimulations simultanées des neurones A et C par des intensités respectives i_1 et i_3 , on enregistre au niveau de O₁ et de O₃ une ddp de -70mV correspondant au PR.

Enregistrement au niveau de O₂ :

Suite à une stimulation du neurone B par une intensité i_2 , on enregistre au niveau de O₂ une ddp passant de -70mV à +30 mV. C'est le PA.

Condition nécessaire : une stimulation d'intensité liminaire est nécessaire à la naissance d'un message nerveux au niveau des neurones A, B et C

Enregistrement au niveau de O₄ :

Nature de l'enregistrement: il s'agit d'une dépolarisation inférieure au seuil de déclenchement d'un PA (< -50 mV) ; il s'agit d'un PPSE.

Nature de la synapse B-M : la synapse B-M est une synapse excitatrice.

2. a- On enregistre au niveau de O₄ une légère dépolarisation qui n'atteint pas le seuil de déclenchement d'un PA, il s'agit bien d'un PPSE, seulement, son amplitude est inférieure à celle obtenue en O₄ du document 2. Il s'est produit alors une sommation spatiale d'un PPSE obtenu à la suite de l'excitation de neurone B(synapse B-M) et d'un PPSI obtenu à la suite de la stimulation du neurone C (synapse C-M) et dont la résultante est un PPSE de plus faible amplitude.

b- La synapse C-M est une synapse inhibitrice

3.a- On enregistre au niveau de O₄ un PPS qui atteint le seuil de dépolarisation de la membrane post synaptique -50mV. D'où la naissance d'un PA. Ce PPS résulte de la sommation spatiale des PPS obtenus à la suite de la stimulation simultanée des neurones A, B et C par i_2 .

➡ La synapse A-M est une synapse excitatrice.

b- Lorsque les neurones A, B et C sont stimulés simultanément par des stimulations d'intensité i_2 , on enregistre au niveau du neurone post synaptique M un PPS global qui est la somme algébrique de deux PPSE dus à l'activation des deux synapses excitatrices A-M et B-M et d'un PPSI dû à l'activation de la synapse inhibitrice C-M. Cette capacité du neurone post synaptique M à faire la somme algébrique de deux PPSE et d'un PPSI est l'**intégration synaptique**.

2. **Expérience 1 :** l'injection de GABA dans la fente synaptique de la synapse C-M donne lieu à un PPSI. Le GABA est le neurotransmetteur inhibiteur de cette synapse.

Expérience 2 : l'injection de toxine tétanique dans la fente synaptique, suivie de la stimulation efficace du neurone C, empêche l'action du neurotransmetteur (GABA) au niveau de la synapse C-M.

Expérience 3 :

- Au niveau de X₁ (membrane post synaptique) la radioactivité détectée est forte. Le GABA radioactif s'est fixé sur la membrane post synaptique au niveau de récepteurs qui lui sont spécifiques.
- Au niveau de la fente synaptique de la synapse C-M la radioactivité est faible puisque la presque totalité de la quantité de GABA va passer de la fente pour se fixer sur la membrane post synaptique.
- Au niveau de X₂ (membrane pré synaptique) la radioactivité est nulle car la substance radioactive ne peut en aucun cas se fixer sur cette membrane.

➡ **Mécanisme de fonctionnement de la synapse C-M :**

- Suite à l'arrivée d'un PA au niveau de la membrane pré synaptique il se produit :
- libération, par exocytose, du GABA dans la fente synaptique de la synapse C-M
- fixation du GABA sur les récepteurs qui lui sont spécifiques localisés sur la membrane post synaptique.
- hyperpolarisation de la membrane post synaptique (PPSI)

EXERCICE 12

EXERCICE 14 bac math cont 13

1- a)

- Tracé obtenu en O1 : **un PA**
- Tracé obtenu en O2 : **Un PPSE**
- Tracé obtenu en O4 : **Un PPSI**

b) Tracé obtenu en O3 : ♣

Stimulation efficace St1 → PA propageable → naissance de 3 PPSE au niveau de N2 → sommation spatiale des 3 PPSE au niveau du cône axonique de N2 → PPSE globale \geq seuil → naissance d'un PA en O3

Tracé obtenu en O5 : Le PA enregistré en O3 se propage le long du neurone N2 → naissance de 3 PPSI au niveau du neurone N3 → sommation spatiale des 3 PPSI → PPSI globale d'amplitude 7mv en O5.

c)

- Neurone N1 : **neurone exciteur**
- Neurone N2 : **neurone inhibiteur**

2- Nature de la réponse : **un PA** Justification :

- Une stimulation isolée portée en St2 engendre en O2 un PPSE d'amplitude 10 mv ; celui-ci se propage et diminue d'amplitude ; d'où l'enregistrement d'un PPSE d'amplitude 7 mv enregistré en O3 (au niveau du cône de N2)

3 stimulations rapprochées en St2 seront à l'origine de 3 PPSE successifs d'amplitude 7 mv chacun ; la sommation temporelle de ces 3 PPSE engendre au niveau du cône de N2 un PPSE global d'amplitude 21 mv et déclenche la naissance d'un PA.

3- Le neurone N2 a un rôle intégrateur, il est capable d'intégrer les informations qui lui parviennent du neurone présynaptique N1 par sommation spatiale et temporelle. Si la somme obtenue est égale ou supérieure au seuil, il y a naissance d'un PA propageable, sinon, N2 reste au repos

EXERCICE 15 : bac sc prin 14

EXERCICE 16 : bac sprt prin14

EXERCICE 17 : bac M. 16

1) fibre A : fibre amyélinisée et fibre B : fibre myélinisée

2) Analyse :

- Pour les stimulations d'intensité allant de i_1 à i_4 , l'amplitude du potentiel membranaire croit de 0 à 16 mV
- A partir de l'intensité de stimulation i_5 , l'amplitude du potentiel membranaire devient maximale et constante = 100 mV.

a-

- En utilisant des intensités allant de i_1 à i_4 , on obtient des potentiels d'amplitude $<$ au seuil \Rightarrow ces intensités sont infraliminaire
- A partir de l'intensité de stimulation i_5 , on obtient un potentiel d'action (d'amplitude 100 mV) \Rightarrow ces intensités sont supraliminaire.

b-

- Avec i_3 , on obtient un potentiel local
- Avec i_6 , on obtient un potentiel d'action.

c-

- Propriété du potentiel local : graduable
- Propriété du potentiel d'action : obéit à la « loi du tout ou rien ».

3) a-

Pour la fibre A

Distance $O_1 - O_2 = 2$ cm

Différence entre les temps de latence :
 $\Delta T = 4$ ms

$$V_A = \frac{2 \cdot 10^{-2}}{4 \cdot 10^{-3}} = 5 \text{ ms}^{-1}$$

Pour la fibre B

Distance $O_1 - O_2 = 2$ cm

Différence entre les temps de latence : $\Delta T = 1$ ms

$$V_B = \frac{2 \cdot 10^{-2}}{1 \cdot 10^{-3}} = 20 \text{ ms}^{-1}$$

b-

$$V_B > V_A$$

Cette différence de vitesse est expliquée par :

- Le mode de propagation du message nerveux qui est saltatoire et rapide au niveau de la fibre myélinisée (fibre B) alors qu'il est de proche en proche et moins rapide au niveau de la fibre amyélinisée (fibre A)
- Le diamètre de la fibre B qui est supérieur à celui de la fibre A.

1)

a-

- Le document 3 montre un PPSI d'amplitude 5 mV obtenu suite à la stimulation St_1 portée sur N_1 ; cette réponse peut être obtenue suite à l'arrivée d'un PA au niveau de la terminaison nerveuse de N_3 faisant synapse avec N_4 .

Donc la synapse N_1-N_3 est une synapse excitatrice.

- La stimulation efficace St_1 , portée au niveau de N_1 + les deux St_2 successives et rapprochées, portées au niveau de N_2 , assurent la contraction du muscle; il y a eu naissance d'un PA au niveau du cône axonique de N_4 ; ce PA se propage le long de l'axone de N_4 ; il atteint le muscle M d'où sa contraction.

Etant donnée que la synapse N_3-N_4 est inhibitrice (document 3), on peut déduire que la synapse N_2-N_4 est une synapse excitatrice.

b- Propriétés du message nerveux :

- Propageable
- Transmissible.

2) Le neurone N_4 joue un rôle intégrateur par sommation spatio-temporelle de deux PPSE provenant de l'afférence synaptique N_2 (sommation temporelle) et d'un PPSI provenant de l'afférence synaptique N_3 , la résultante est un PPS global qui atteint le seuil de dépolarisation de la membrane de N_4 , conduisant à la naissance d'un PA propageable le long de l'axone de N_4 , atteignant le muscle et assurant sa contraction.

EXERCICE 19 : bac MP15

1) a-

- Suite à la stimulation I_1 :

| | | Identification | Justification |
|---------------------|-------|-----------------|--|
| Enregistrement en : | O_1 | Potentiel local | Le potentiel membranaire passe de -70 mV (état de repos) à -60 mV : c'est une dépolarisation locale. |
| | O_2 | PR | -70 mV est la valeur du potentiel membranaire de la fibre au repos. |
| | O_3 | | |
| | O_4 | | |

- Suite à la stimulation I_2 :

| | | Identification | Justification |
|---------------------|-------|----------------|---|
| Enregistrement en : | O_1 | PA | Le potentiel membranaire passe de -70 mV (état de repos) à $+30$ mV |
| | O_3 | | |
| | O_4 | | |
| | O_2 | PPSE | Le potentiel membranaire passe de -70 mV (état de repos) à -58 mV |

2)

a-

Au niveau du cône axonique de N_3 , une seule stimulation d'intensité I_2 en E donne naissance à un PA (expérience 1) alors que deux stimulations très rapprochées d'intensité I_2 engendrent un PPSE inférieur au seuil et d'amplitude 18 mV (expérience 2).

Explication :

- Les deux stimulations rapprochées en E activent la synapse excitatrice N_1-N_2 et donnent 2 PPSE qui par sommation temporelle au niveau du cône axonique de N_2 engendrent un PPS global atteignant le seuil et donnant naissance à un PA propageable le long de N_2 ; ce PA active la synapse N_2-N_3 et entraîne la naissance d'un PPSI en N_3 .
- Au niveau du N_3 , la somme algébrique des PPSE, dus à l'activation des synapses N_1-N_3 , et du PPSI, dû à l'activation de la synapse N_2-N_3 ; donne un PPSE global de 18 mV (document 3) qui reste inférieur au seuil et incapable d'engendrer la naissance d'un PA en N_3 .

b- La synapse N_2-N_3 est une synapse inhibitrice.

1-

Analyse : Le potentiel membranaire obtenu en O₁ suite à la stimulation mécanique S₁ est un potentiel local d'amplitude égale à 13 mV ; ce potentiel diminue d'amplitude : 8 mV en O₂ puis s'annule en O₃.

Identification :

- Au niveau de O1 et O2 : potentiels de récepteurs
Au niveau O3 : PR
- Au niveau du corpuscule de Pacini, la stimulation mécanique est convertie par transduction sensorielle en potentiel électrique
- Le potentiel local se propage sur une courte distance ; il est à décroissement spatial.

2-

La stimulation S₂ est à l'origine d'un potentiel local dont l'amplitude atteint le seuil engendrant ainsi un potentiel d'action (PA) qui est détecté grâce à R₂ introduite au niveau du premier nœud de Ranvier et enregistré en O₂ ; ce PA se propage vers le 2^{ème} nœud de Ranvier en conservant la même amplitude d'où le tracé enregistré en O₃


Propriétés du message nerveux:

- Le message nerveux est propageable
- Le message nerveux est codé en modulation de fréquence
- Le message nerveux obéit à la loi du tout ou rien.

NB : Exiger une seule propriété

- 3- Naissance d'un message nerveux au niveau du premier nœud de Ranvier.
Propagation du message nerveux le long de N1
Transmission du message nerveux à travers la synapse N1- N2 excitatrice.
Exocytose du neurotransmetteur dans la fente synaptique et sa fixation sur les récepteurs spécifiques de la membrane de N2.
Entrée de Na⁺ à travers les CCD permettant la dépolarisation de la membrane
Naissance d'un PPSE d'amplitude 7mV enregistré au niveau du cône axonique de N2.

4- Enregistrement attendu en O5 :



5-

| neurones | N1 | N2 | N3 |
|-----------|---|--------------------------------|--|
| fonctions | Naissance, propagation et transmission du message nerveux | Naissance d'un potentiel local | Naissance du message nerveux et intégration par sommation temporelle et conduction |