

EXERCICE N°1 : (4 points)

1. a. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation :

$$z^2 - 4z + 6 = 0.$$

- b. On désigne par M_1 et M_2 les points d'affixes respectives :

$$z_1 = 2 + i\sqrt{2} \quad \text{et} \quad z_2 = 2 - i\sqrt{2}.$$

Déterminer la forme algébrique du nombre complexe $\frac{z_1 - 3}{z_1}$.

En déduire que le triangle OBM_1 est un triangle rectangle.

- c. Démontrer sans nouveau calcul que les points O, B, M_1 et M_2 , appartiennent à un même cercle \mathcal{C} que l'on précisera.

Tracer le cercle \mathcal{C} et placer les points M_1 et M_2 sur le dessin.

2. On appelle f l'application du plan qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' définie par l'égalité :

$$z' = z^2 - 4z + 6.$$

On désigne par Γ le cercle de centre A et de rayon $\sqrt{2}$. Ce cercle ne sera pas tracé sur le dessin.

- a. Vérifier l'égalité suivante $z' - 2 = (z - 2)^2$.

- b. Soit M le point de Γ d'affixe $z = 2 + \sqrt{2}e^{i\theta}$ où θ désigne un réel de l'intervalle $] -\pi ; \pi]$. Vérifier l'égalité suivante : $z' = 2 + 2e^{2i\theta}$ et en déduire que M' est situé sur un cercle Γ' dont on précisera le centre et le rayon. Tracer Γ' sur le dessin.

3. On appelle D le point d'affixe $d = 2 + \frac{\sqrt{2} + i\sqrt{6}}{2}$ et on désigne par D' l'image de D par f .

- a. Écrire sous forme exponentielle le nombre complexe $d - 2$.
En déduire que D est situé sur le cercle Γ .

- b. À l'aide la question 2.b, donner une mesure de l'angle (\vec{u}, \vec{AD}') et placer le point D' sur le dessin.

- c. Démontrer que le triangle DAD' est équilatéral.

EXERCICE N°2 : (6points)

On considère la suite numérique (v_n) définie pour tout entier naturel n par
$$\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_{n+1} = \frac{9}{6-v_n} \end{cases}.$$

a. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , $0 < v_n < 3$.

b. Démontrer que, pour tout entier naturel n , $v_{n+1} - v_n = \frac{(3-v_n)^2}{6-v_n}$.

La suite (v_n) est-elle monotone ?

c. Démontrer que la suite (v_n) est convergente.

Partie B : Recherche de la limite de la suite (v_n)

On considère la suite (w_n) définie pour tout n entier naturel par $w_n = \frac{1}{v_n - 3}$.

1. Démontrer que (w_n) est une suite arithmétique de raison $-\frac{1}{3}$.

2. En déduire l'expression de (w_n) , puis celle de (v_n) , en fonction de n .

3. Déterminer la limite de la suite (v_n) .

EXERCICE N°03 : (4points)

Soit l'espace muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les points A (1,-2,2) ;

B (1,0,1) et l'ensemble S des points M(x, y, z) tels que : $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4z = 0$.

1) Montrer que S est une sphère dont on précisera son centre I et son rayon R.

2) Soit P le plan passant par E(1,1,-1) et perpendiculaire à la droite (AB).

a- Déterminer une équation cartésienne du plan P.

b- Montrer que P et S sont tangents et préciser les coordonnées de leur point de contact H.

3) Soit Q le plan tangent à S en B.

a- Montrer qu'une équation cartésienne du plan Q est $-2x + z + 1 = 0$.

b- Montrer que les plans P et Q sont sécants et déterminer la droite $\Delta = P \cap Q$.

c- Montrer que $\Delta \cap S = \emptyset$.


4) Soit Q_m : $-2x + z + m = 0$ ou m est un paramètre réel.

a- Déterminer suivant les valeurs de m : $S \cap Q_m$.

b- Montrer que Q_0 coupe la sphère S suivant un cercle ζ qu'on déterminera son rayon r et son centre H' .

EXERCICE N°04 : (6 points)

Sur le graphique ci-dessous, on a tracé, dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, la courbe représentative \mathcal{C} d'une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $]0, +\infty[$.



On dispose des informations suivantes :

- les points A, B, C ont pour coordonnées respectives $(1, 0), (1, 2), (0, 2)$;
- la courbe \mathcal{C} passe par le point B et la droite (BC) est tangente à \mathcal{C} en B ;
- il existe deux réels positifs a et b tels que pour tout réel strictement positif x ,

$$f(x) = \frac{a + b \ln x}{x}.$$

- En utilisant le graphique, donner les valeurs de $f(1)$ et $f'(1)$.
 - Vérifier que pour tout réel strictement positif x , $f'(x) = \frac{(b-a) - b \ln x}{x^2}$.
 - En déduire les réels a et b .
- Justifier que pour tout réel x appartenant à l'intervalle $]0, +\infty[$, $f'(x)$ a le même signe que $-\ln x$.
 - Déterminer les limites de f en 0 et en $+\infty$. On pourra remarquer que pour tout réel x strictement positif, $f(x) = \frac{2}{x} + 2 \frac{\ln x}{x}$.
 - En déduire le tableau de variations de la fonction f .
- Démontrer que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution α sur l'intervalle $]0, 1]$.
 - Par un raisonnement analogue, on démontre qu'il existe un unique réel β de l'intervalle $]1, +\infty[$ tel que $f(\beta) = 1$.
Déterminer l'entier n tel que $n < \beta < n + 1$.

- a. Justifier que cela revient à démontrer que $\int_{\frac{1}{e}}^1 f(x) dx = 1$.
- b. En remarquant que l'expression de $f(x)$ peut s'écrire $\frac{2}{x} + 2 \times \frac{1}{x} \times \ln x$, terminer la démonstration.