

Série d'exercices
Polynôme- Barycentre- translation

Exercice n°1

- 1/ Factoriser x^2+x-3
- 2/ Soit $f(x)=x^3-x^2-5x+6$
 - a/ Vérifier que 2 est une racine de $f(x)$
 - b/ Factoriser $f(x)$
 - c/ résoudre dans \mathbb{R} $f(x)=0$
 - d/ résoudre dans \mathbb{R} $f(x)<0$

Exercice n°2

On donne $A(x) = x^3 - 8x^2 + 19x - 12$ et $B(x) = x^4 + 2x^3 - 16x^2 - 2x + 15$.

- 1)
 - a/ Vérifier que 1 est une solution de l'équation $A(x) = 0$.
 - b/ Déterminer les réels a, b et c tel que $A(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$.
 - c/ On donne $a = 1$, $b = -7$ et $c = 12$.
 - i/ Résoudre alors $A(x) = 0$.
 - ii/ Déduire une factorisation maximale de $A(x)$.
 - d/ Résoudre l'inéquation $A(x) < -12$.
- 2)
 - a/ Vérifier que 1 et (-1) sont deux solutions de l'équation $B(x) = 0$.
 - b/ Factoriser alors $B(x)$.
 - c/ Résoudre dans \mathbb{R} l'équation $x^2 + 2x - 15 = 0$.
 - d/ Factoriser le trinôme $x^2 + 2x - 15$ et déduire une factorisation maximale de $B(x)$.
- 3) On pose $K(x) = B(x) - A(x)$ pour tout réel x.
 - a/ Calculer $B(3)$, $B(1)$, $A(3)$ et $A(1)$.
 - b/ Déduire deux racines de $K(x) = 0$.
 - c/ Factoriser $K(x)$.
 - d/ Résoudre alors l'équation $A(x) = B(x)$.
 - e/ Résoudre l'inéquation $K(x) < 0$.
 - f/ Déduire le signe du réel : $(2006)^4 + (2006)^3 - 8(2006)^2 - 21(2006) + 27$.
- 4) Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{A(x)} - \frac{6}{x-1}$.
 - a/ Déterminer l'ensemble de définition de f puis simplifier l'expression de f(x).
 - b/ Résoudre l'inéquation : $\frac{1}{(x-1)(x^2-7x+12)} < \frac{6}{x-1}$.

Exercice n°3

Soit A, B et C trois points du plan non alignés.

1) a/ Construire le point I barycentre des points pondérés (A,2) et (B,3).

b/ Déterminer l'ensemble : $E = \left\{ M \in \mathcal{P} \text{ tel que } \left\| 2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} \right\| = 5 \left\| \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} \right\| \right\}$

2) On désigne par G le barycentre des points A, B et C affectés au coefficients 2, 3 et 5.

a/ Montrer que G est le milieu de [IC].

b/ Construire G.

c/ Soit J le barycentre des points pondérés (B,3) et (C,5).

Montrer que G est le barycentre des points pondérés (J,8) et (A,2).

3) Soit K le barycentre des points A et C affectés au coefficients 2 et 5.

a/ Montrer que G est le barycentre des points pondérés (K,7) et (B,3).

b/ En déduire que les droites (AC) et (BG) sont sécantes en K, puis construire K.

4) Déterminer l'ensemble : $F = \left\{ M \in \mathcal{P} \text{ tel que } \left\| 2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 5\overrightarrow{MC} \right\| = 2 \left\| 2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} \right\| \right\}$.

5) Montrer que $\frac{GK}{KB} + \frac{GJ}{AJ} + \frac{GI}{IC} = 1$.

6) On donne les points B', C', I' et G' tels que : $10\overrightarrow{CG} + 3\overrightarrow{BA} + 5\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{0}$ et C', I', G' sont les images respectives des points C, I, G par $t_{\overline{AC}}$.

a/ Construire B', C', I' et G'.

b/ Montrer que G' est le milieu de [I'C'].

c/ La parallèle à (BG) passant par B' coupe (AC) en K'. Montrer que $K' = t_{\overline{AC}}(K)$.

d/ Montrer que K' est le barycentre des points A' et C' affectés aux coefficients que l'on déterminera.

e/ Soit le point M' du plan tel que : $3\overrightarrow{MM'} - \overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CM}$.

Déterminer l'ensemble des points M' lorsque M décrit l'ensemble E puis lorsque M décrit l'ensemble F.

Exercice n°4

Soit $p(x) = 4x^3 - 2x^2 - 5x - 14$

1/ Vérifier que 2 est une racine de p(x) et factoriser p(x)

2/ Simplifier $\frac{p(x)}{x^3 - 8 + x - 2}$

3/ Soit $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x - 6$

a/ Vérifier que (-2) est une racine de f(x)

b/ Factoriser f(x)

c/ résoudre dans R $f(x) < 0$

4/ Soit $g(x) = -5x^3 + 4x^2 + 8x - 7$

factoriser g(x) puis / Résoudre $g(x) \leq 0$

