

Exercice 1 :

Cocher la bonne réponse :

1) Soit l'équation $|2x + 1| = 1$

$S_{\mathbb{R}} = \{0 ; -1\}$

$S_{\mathbb{R}} = \{1 ; -1\}$

$S_{\mathbb{R}} = \{-1 ; 2\}$

2) Soit l'équation $x^2 = -2$

$S_{\mathbb{R}} = \emptyset$

$S_{\mathbb{R}} = \{\sqrt{-2} ; -\sqrt{-2}\}$

$S_{\mathbb{R}} = \{\sqrt{2} ; -\sqrt{2}\}$

3) Si $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{FK}$ alors

$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{KE}$

$\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{EF}$

$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{EK}$

4) Si ABCD est un trapèze de bases $[AB]$ et $[CD]$ alors l'image de (AB) par la translation de vecteur \overrightarrow{AC} est (CD) : vrai faux

Exercice 2 :

I. Soit f une fonction linéaire tel que $f(4) + f(-2) = 4$

1) Montrer que $f(x) = 2x$

2) Tracer Δ_f la représentation graphique de f dans un repère (o, \vec{i}, \vec{j}) .

3) Soient les points E(-2,-4) et F(3,6) :

Montrer que les points E et F appartiennent à Δ_f .

II. 1) Résoudre dans \mathbb{R} les équations suivantes :

a) $9x^2 + 12x + 4 = 0$

b) $x^3 + (x + 5)(3 - x^2) + 125 = 0$

c) $|4x + 3| = 8$

2) Résoudre dans \mathbb{R} les inéquations suivantes :

a) $(x - 1)^2 > (2x - 3)^2$

b) $\frac{1-x}{x+3} \geq 0$

Exercice 3 :

Soient \mathcal{C} et \mathcal{C}' deux cercles sécants en A et B de même rayons et de centres respectifs O et O'.

- 1) On pose $t_{\overline{OO'}}(A) = A'$; montrer que $A' \in \mathcal{C}'$
- 2) La parallèle à (AB) menée de A' coupe \mathcal{C}' en B' ; montrer que $t_{\overline{OO'}}(B) = B'$
- 3) Quelle est la nature du quadrilatère AO'BO ?
- 4) (AO) coupe \mathcal{C} en E, montrer que B est le milieu du segment [B'E]