

Lycée Tahar Sfar Mahdia	<i>Devoir de Synthèse n° 1</i> Mathématiques	Niveau : 2 ^{ème} Sc et Info
Date : 08 / 12 / 2009	Profs : Dermech, Smida, et Meddeb	Durée : 2 heure


NB : il sera tenu compte du soin apporté à la rédaction et à la présentation.

Exercice n°1 : (3 pts)

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. On indiquera sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondante à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

Une réponse exacte rapporte 0,75 point, une réponse fausse enlève 0,25 point, et l'absence de réponse est comptée 0 point. Si le total est négatif, la note sera ramenée à zéro.

1) On donne la figure suivante :



Le point C est le barycentre des points pondérés :

- a/ (A, 4), (B, 3) b/ (A, 3), (B, 4) c/ (A, -3), (B, 4)

2) L'ensemble des solutions de l'équation : $12x^2 + 11x - 5 = 0$ est :

- a/ $S_{IR} = \left\{ \frac{1}{3}, \frac{5}{4} \right\}$ b/ $S_{IR} = \left\{ \frac{-1}{3}, \frac{5}{4} \right\}$ c/ $S_{IR} = \left\{ \frac{1}{3}, \frac{-5}{4} \right\}$.

3) Soit b un réel, l'équation : $2x^2 + bx + 3 = 0$ admet toujours :

- a/ Deux solutions b/ Zéro solution c/ Je ne sais pas.

4) Lorsque x est dans l'intervalle $[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$, le trinôme $-x^2 + 3x - 2$ est :

- a/ Toujours positif b/ Toujours négatif c/ Je ne sais pas.

Exercice n°2 : (7 pts)

On considère les polynômes A et P définis par : $A(x) = 4x^4 - 13x^2 + 9$.

$$P(x) = 2x^3 + 3x^2 - 5x - 6.$$

- a/ Factoriser le trinôme : $4x^2 - 13x + 9$.
b/ En déduire la factorisation de A(x) en produit de quatre facteurs.
- a/ Vérifier que (-1) est une racine de P.
b/ En déduire que : $P(x) = (x + 1)R(x)$ où R est un polynôme que l'on déterminera.
- Soit F la fonction rationnelle définie par : $F(x) = \frac{A(x)}{P(x)}$.
a/ Déterminer le domaine de définition de F, puis simplifier F(x).
b/ Résoudre dans IR : $F(x) \geq 0$. puis $\sqrt{F(x)} = 2\sqrt{x-1}$.



Exercice n°3 : (4 pts)

Soit ABC un triangle et I le milieu de $[BC]$. Δ est parallèle à (AI) passant par B .

Soit t la translation de vecteur \overrightarrow{AB} .

- 1) Déterminer l'image de la droite (AI) par t .
- 2) La parallèle à (AB) passant par C coupe (AI) en L et la droite Δ en K .
 - a/ Montrer que : $t(C) = L$.
 - b/ Déterminer en justifiant l'image de L par t .
- 3) Le cercle \mathcal{C} de diamètre $[AC]$ recoupe (AB) en M et Le cercle \mathcal{C}' de diamètre $[BL]$ recoupe (AB) en N .
Montrer que $t(M) = N$.


Exercice n°4 : (6 pts)

Soit $ABCD$ un quadrilatère, G est le centre de gravité du triangle ABC , I et J sont les milieux respectifs des segments $[AB]$ et $[BC]$.

- 1) Soit L le barycentre des points pondérés $(A, 1)$, $(D, 3)$, et K le barycentre des points pondérés $(C, 1)$, $(D, 3)$.

Construire L et K .

- 2) Soit H le point défini par : $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} + 3\overrightarrow{HD} = \vec{0}$.
 - a/ Montrer que H est le barycentre des points pondérés $(I, 1)$, $(K, 2)$.
 - b/ Montrer que les points J , H et L sont alignés.
 - c/ Construire alors le point H . Justifier.
- 3) Montrer que les droites (IK) , (JL) et (GD) sont concourantes.
- 4) Déterminer et construire l'ensemble \mathcal{E} des points M du plan vérifiant :
 $\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = \|\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}\|$.



Bonne chance



