

Exercice 1 (3 points)

Répondre par vrai ou faux en justifiant la réponse.

- 1) Soit U et V deux suites réelles définies sur \mathbb{N} et telles que pour tout entier n on a : $V_n = (-1)^n U_n$. Si (U_n) est convergente alors (V_n) est convergente.
- 2) Si $\frac{\pi}{3}$ est un argument d'un nombre complexe z alors un argument de iz^3 est $(-\frac{\pi}{3})$.
- 3) Soit f et g deux fonctions définies sur \mathbb{R} . Si f est paire et g est impaire alors $f \circ g$ est impaire.

Exercice 2 :(6points)

Soit f la fonction définie sur $] - \infty ; 1]$ par $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 2} + 1$

1) Montrer que l'équation $f(x) = 4x$ admet dans $] - \infty ; 1]$ une solution unique α .
Vérifier que $0 < \alpha < 1$.

2) Soit (U_n) la suite définie sur \mathbb{N} par $U_0 = \frac{\alpha}{2}$ et pour tout entier naturel n ,

$$U_{n+1} = \frac{1}{4} f(U_n).$$

a) Montrer que pour tout entier n ; $0 < U_n < 1$.

b) Montrer que $\forall x \in [0, 1]$ on a $|f'(x)| \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$

c) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$; $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{\sqrt{2}}{8} |U_n - \alpha|$

d) Dédurre que $\forall n \in \mathbb{N}$ $|U_n - \alpha| \leq (\frac{\sqrt{2}}{8})^n$ puis que la suite (U_n) est convergente et déterminer sa limite.

3) Soit g la fonction définie sur $] 0 ; \frac{\pi}{2}]$ par $g(x) = f(1 + \cotan x)$

a) Montrer que $\forall x \in] 0 ; \frac{\pi}{2}]$, $g(x) = 1 + \frac{1}{\sin x}$.

b) Montrer que g réalise une bijection de $] 0 ; \frac{\pi}{2}]$ sur $[2 ; + \infty [$

c) Montrer que g^{-1} est dérivable sur $] 2 ; + \infty [$ et que pour tout $x \in] 2 ; + \infty [$

$$\text{on a } (g^{-1})'(x) = \frac{-1}{(x-1)\sqrt{x^2 - 2x}}.$$

Exercice 3 (6 points)

Soit U la suite définie sur \mathbb{N} par $U_0 = 4$ et $U_{n+1} = \frac{U_n^2 - 3U_n + 6}{U_n - 1}$.

- 1) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} \quad ; \quad 3 \leq U_n \leq 4$
- 2) a) Montrer que la suite U est décroissante.
b) En déduire que U est convergente et déterminer sa limite.
- 3) a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$ on a : $U_{n+1} - 3 \leq \frac{1}{2} (U_n - 3)$.
b) Déduire que $\forall n \in \mathbb{N}$, $U_n - 3 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$. Retrouver alors la limite de U .
- 4) a) Montrer que $\forall n \geq 4 ; \quad 2^n \geq n^2$.
b) Déduire que $\forall n \geq 4 ; \quad n (U_n - 3) \leq \frac{1}{n}$.
Déterminer alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} [n (U_n - 3)]$
- 5) On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{6}{U_k - 1}$ et $S'_n = \sum_{k=0}^n \frac{2U_k}{U_k - 1}$
a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} ;$ on a : $U_{n+1} = S_n - S'_n + 4$.
b) Déterminer la limite de S_n puis celle de S'_n .

Exercice 4 (5 points)

On considère dans \mathbb{C} l'équation (E) : $z^2 - (1+2i) e^{i\theta} z - (1-i) e^{2i\theta} = 0$ avec $\theta \in [0; \pi]$.

- 1) a) Montrer que $z_1 = i e^{i\theta}$ est une solution de (E). Déterminer alors l'autre solution z_2 de (E).
b) Ecrire z_1 et z_2 sous forme exponentielle.
c) Pour $\theta = \frac{\pi}{3}$, écrire z_2 sous forme exponentielle et sous forme cartésienne.

En déduire la valeur de $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

- 2) Dans le plan complexe muni d'un ROND $(o ; \vec{u}; \vec{v})$ on considère les points $A ; B ; C$ et D d'affixes respectives $z_A = 2$, $z_B = 2 + e^{i\theta}$, $z_C = i e^{i\theta}$ et $z_D = (1+i) e^{i\theta}$
a) Déterminer et construire l'ensemble des points B lorsque θ décrit $[0, \pi]$.
b) Vérifier que pour tout $\theta \in [0; \pi]$ les points A, B et C ne sont pas alignés.
c) Montrer que $ABDC$ est un parallélogramme.
d) Peut on déterminer θ pour que $ABDC$ soit un losange.