

EXERCICEN°1(2PTS)

Pour chacune des questions suivantes une seule des trois réponses est exacte indiquer la.

1)Une primitive sur IR de la fonction $x \rightarrow x \sin(x^2+1)$ est

a) $x \rightarrow -2 \cos(x^2+1)$ b) $x \rightarrow -\frac{1}{2} \cos(x^2+1)$ c) $x \rightarrow \frac{1}{2} \sin(x^2+1)$

2)La fonction $x \rightarrow x\sqrt{x}$ est la primitive sur $[0; +\infty[$ qui s'annule en 0 de la fonction

a) $x \rightarrow \frac{3}{2}\sqrt{x}$ b) $x \rightarrow \frac{2}{5}x^2\sqrt{x}$ c) $x \rightarrow \frac{2}{\sqrt{x}}$

EXERCICEN°2(5PTS)

Dans la figure ci-jointe (C) est la courbe représentative d'une fonction f définie sur \mathbb{R}^* . (C) admet une branche parabolique de direction la droite D d'équation $Y=X$ au voisinage de $(+\infty)$ et $(-\infty)$. La droite T est la tangente à (C) au point de coordonnées $(-1 ; -1)$; T passe par les points $A(-2 ; 0)$. En utilisant la figure ci-jointe répondre aux questions suivantes.

1)Déterminer :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$

2) Déterminer $f'(-2)$ et $f'(-1)$.

3) Dresser le tableau de variation de la fonction f .

4) a) Soit h la restriction de la fonction f à l'intervalle $]0, +\infty[$. Montrer que h est une bijection de $]0, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera.

b) Tracer (C') la représentation graphique de la fonction réciproque de h dans le même repère

EXERCICE N°3(7PTS)

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = 2 + \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 4}}$. On désigne par (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(o; \vec{i}; \vec{j})$.

1)a) Montrer que f est dérivable sur \mathbb{R} et que $f'(x) = \frac{8}{(\sqrt{x^2 + 4})^3} \forall x \in \mathbb{R}$

b) Dresser le tableau de variation de f .

2)a) Donner une équation de la tangente T à (C) au point d'abscisse 0.

b) Vérifier que $I(0; 2)$ est un centre de symétrie pour (C) .

3) Tracer T et (C) .

4) Soit g la restriction de f à l'intervalle $[0; +\infty[$.

a) Montrer que g réalise une bijection de $[0; +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera.


b) Tracer dans le même repère (C') la courbe représentative de g^{-1} fonction réciproque de g .

c) Expliciter $g^{-1}(x)$ pour $x \in J$.

EXERCICE N°4(6PTS)

La figure ci contre représente un cube ABCDEFGH.

On munit l'espace du repère orthonormé direct $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.



On considère les points $I\left(\frac{1}{2}, 0, 1\right)$, $J\left(1, \frac{1}{2}, 1\right)$ et L le point défini par $\overrightarrow{AL} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$

1) Vérifier que I et J sont les milieux respectifs des segments $[EF]$ et $[FG]$

2) a) Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{U} = \overrightarrow{EL} \wedge \overrightarrow{EG}$

b) En déduire l'aire du triangle ELG .

- c) Montrer que E, L, F et G ne sont pas coplanaires.
- d) Calculer le volume du tétraèdre ELFG.
- e) En déduire la distance FH avec H est le projeté orthogonale de F sur le plan (GLE).
- f) Montrer qu'une équation cartésienne du plan (GLE) est : $4x - 4y + 3z - 3 = 0$.
- 3) Donner une représentation paramétrique de la droite (FB)

BON TRAVAIL