

DEVOIR DE CONTRÔLE N°3

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 (4 points)

Pour chacune des questions suivantes une seule réponse est exacte, cocher la bonne case.

Questions	Réponses
1. Soit f la fonction définie par : $f(x) = -(x - 1)^3$. La courbe \mathcal{C}_f de f admet un point d'inflexion au point d'abscisse	<input type="checkbox"/> $x = -1$ <input type="checkbox"/> $x = 1$ <input type="checkbox"/> $x = 0$
2. Pour tous vecteurs \vec{u} , \vec{v} et \vec{w} tels que : $\vec{w} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$, on a :	<input type="checkbox"/> $\vec{v} = \vec{0}$ <input type="checkbox"/> $\vec{u} = \vec{w}$ <input type="checkbox"/> $\vec{v} \perp (\vec{u} - \vec{w})$
3. Soit (O, \vec{i}, \vec{j}) un repère orthogonal, la courbe \mathcal{C}_g de la fonction g définie par : $g(x) = 1 - 8x + 4x^2$ admet pour axe de symétrie la droite d'équation :	<input type="checkbox"/> $x = 1$ <input type="checkbox"/> $x = -1$ <input type="checkbox"/> $x = 0$
4. Si ABC est un triangle tels que : $AB = BC = 4$ et $AC = 2$ alors le réel $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$ vaut	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8

Exercice 2 (8 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par :

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 2}$$

On désigne par \mathcal{C}_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) .

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, interpréter graphiquement ces résultats.

2. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

b) Montrer que : $f'(x) = \frac{x^2 - 4x}{(x - 2)^2}$ puis dresser le tableau de variation de f .

3. a) Vérifier que, pour tout $x \neq 2$, $f(x) = x - 1 + \frac{4}{x - 2}$

b) En déduire que \mathcal{C}_f admet une asymptote oblique Δ que l'on précisera.

c) Etudier la position relative de \mathcal{C}_f et Δ .

4. a) Montrer que le point $I(2; 1)$ est un centre de symétrie de la courbe \mathcal{C}_f .

b) Recopier puis compléter sur votre copie le tableau de valeurs suivant :

x	-2	0	1	3
$f(x)$				

c) Tracer \mathcal{C}_f ainsi que ses asymptotes.

5. Discuter graphiquement et suivant le paramètre réel m le nombre de solutions de l'équation : $f(x) - m = 0$.

Exercice 3 (4 points)

Soit ABC un triangle équilatéral de côté 4, on désigne par E et F les points du plan tels que : $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{2} \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AC}$. Le but de l'exercice est de montrer que les droites (EF) et (AC) sont perpendiculaires.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$

2. Montrer que : $\overrightarrow{EF} = \frac{5}{2} \overrightarrow{AB} - \frac{5}{4} \overrightarrow{AC}$

3. En déduire que les droites (EF) et (AC) sont perpendiculaires.

Exercice 4 (4 points)

Soit $ABCD$ un losange tel que $AC = 8$ et $BD = 10$. On note O le centre de ce losange.

1. Faire une figure.

2. Calculer $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$

3. a) Décomposer le vecteur \overrightarrow{AB} en fonction des vecteurs \overrightarrow{AD} et \overrightarrow{DB}

b) En déduire la valeur de $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$

c) Montrer que : $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 9$